



## Merkblatt: Circo-Schutzimpfung

- ⇒ Impfbeginn:  
ab Anfang September 2008
- ⇒ Anwendung:  
Circo-Impfstoffe sind „Einmal-Impfstoffe“ (one-shot)  
Empfehlung: „**Ingelvac circoflex**“ von Fa. Boehringer Ingelheim  
Dosis 1 ml, garantiert beste Verträglichkeit, kann mit dem Mycoplasmen-Impfstoff „**Ingelvac M.hyo**“, Dosis 2 ml, optimal eingesetzt werden
- ⇒ Impfzeitpunkt:  
Ab einem Alter von 2 Wochen; aus arbeitstechnischer Sicht wird empfohlen, die Circo-Impfung gleichzeitig mit der Mycoplasmen-Impfung am 17. bzw. 18. Lebenstag zu setzen. Auf der einen Seite die Mycoplasmen-Impfung und auf der anderen Seite die Circo-Impfung.
- ⇒ Kostenaufteilung:  
Den Mästern wird ein Impfkostenbeitrag je Ferkel von € 1,50 netto verrechnet, welcher den Züchtern erstattet wird.  
Als lückenloser Nachweis gilt ausschließlich der tierärztliche Abgabebeleg.
- ⇒ Tiergesundheitsdienst:  
Die Einführung der Circovirus-Schutzimpfung erfolgt in Absprache mit dem TGD OÖ. Daher ersuchen wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Betreuungstierarzt.

Ihr Hybada-Team